

## HEKSORAL ÇÖZELTİ

### KULLANIM KILAVUZU

#### FORMÜLÜ:

100 ml. Heksoral çözeltide;

Etken Madde: Heksetidin 100 mg.

Yardımcı Maddeler: POnceau 4r 0.007 g., nane esansı 1.161g., mentol 0.01 g., etanol 7.00 g., sodyum sakarin 0.022 g.

#### TIBBİ ÖZELLİKLERİ:

Heksoral çözelti, tiamin pirofosfatın sentezine mani olarak bakterilerin yok olmasına yardımcı olan bir antiseptiktir. Ağız ve boğazdaki yaralara çabuk ve doğrudan etki gösterir. Ağız ve boğaz yumuşak dokusuna karşı afinitesi yüksektir. Özellikle yumuşak dokulardaki 10-12 saat süren etkinliği dokuların rejenerasyonunda önemli rol oynar. Heksetidin, çok düşük konsantrasyonlar da bile güçlü etki gösterebilir.

#### ÖNERİLEN KULLANIM YERİ:

Heksoral sprej, ağız ve boğazdaki enfeksiyonlarda tonsilit, larenjit, farenjit; diş çekiminden, tonsillektomi ve diğer ağız içi operasyonlarından sonra, stomatit, glosit, mykosen, gingivitis, paradontit ve diş eti kanamalarında, gribal ve soğuk algınlığı hastalıklarında iyileştirmeyi destekleyici tedavide, süper enfeksiyonların önlenmesinde, aft ve mantar enfeksiyonlarında, ayrıca ağız kokusunu önlemek ve iyi bir ağız hijyeninin gerektiği hallerde kullanılır.

#### KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR:

Tavsiye edilen dozlarda kullanılmaması gereken bir durum bildirilmemiştir. Ancak, yeterli çalışma olmadığından gebelikte ve laktasyon döneminde kullanılmamalıdır.

#### UYARILAR / ÖNLEMLER:

Ağızda çalkalayamayacak kadar küçük çocuklarda atuşman ile uygulanabilir. Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildirin. Haricen kullanılır.

#### YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:

Çok uzun süre kullanımlarda ağız ve tad duyumunda hafif ve geçici değişimler olabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)'ne bildirin.

#### İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:

Bildirilen hiçbir vaka yoktur.

**DOZ AŐIMI:**

Pratikte aŐırı doz söz konusu deđildir. Ancak kazara çok miktarda içilmişse doktora başvurulmalı, gastrit ve lavaj yapılmalı ve hasta belirli bir süre kontrol altında tutulmalıdır.

**ÖNERİLEN KULLANIM ŐEKLİ VE DOZU:**

Heksoral çözelti, ađızda çalkalamak ve/veya gargara yapmak içindir. Heksoral çözelti (1 ölçek = 15 ml) yarım dakika müddetle, ađız enfeksiyonlarında çalkalanarak, bođaz enfeksiyonlarında ise gargara yapılarak kullanılır. Sonra ađızdaki çözelti dıŐarı atılır.

YUTULMAMALIDIR.

HEKİME DANIŐMADAN KULLANMAYINIZ.

**TİCARİ TAKDİM ŐEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI:**

200ml'lik amber renkli cam Őişelerde ve 1 adet 15ml'lik ölçek ile sunulmaktadır.